



MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA
POPULATION

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

**DIRECTION DE L'EPIDEMIOLOGIE ET
DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE**



REPUBLIQUE DU CONGO

Unité* travail *progrès

**RAPPORT DES ENQUÊTES : GYTS (ENQUÊTE GLOBALE SUR LE
TABAGISME CHEZ LES JEUNES DE 13 A 15 ANS) ET GSPS
(ENQUÊTE GLOBALE SUR LE PERSONNEL)
EN MILIEU SCOLAIRE**



Mars 2009

SOMMAIRE

TITRE	PAGE
Liste des tableaux	3
Abréviations	4
Mots clés	4
Introduction	5
Objectifs	6
Présentation	6
Méthode	6
Résultats	9
Données comparatives 2006-2009.....	37
Discussion.....	39
Conclusion.....	40
Recommandations.....	41

Liste des tableaux

Etat de participation à l'enquête	9
Répartition des élèves selon le sexe, la localité et le niveau scolaire	10
Prévalence	11
Programme scolaire	12
Cessation du fumeur	13
Environnement tabagique, exposition à la fumée des autres et leur réaction	14
Attitudes et Connaissances	15
Média et publicité	16
Accessibilité et disponibilité à la cigarette	17

Abréviations

GYTS : Global Youth Tobacco Survey (surveillance globale du tabac chez les jeunes)

OMS: Organisation Mondiale de la Santé

CDC : Centre de Contrôle et de prévention des Maladies

USA : Etats – unis d’Amérique

GSPS: Global School Personnel Survey (Surveillance globale du tabac chez le Personnel des établissements enquêtés)

Mots clés:

Tabagisme, jeunes, milieu scolaire, Congo, programme scolaire sur le tabagisme, cessation de fumer, environnement tabagique, nocivité du tabac sur la santé, attitudes et connaissances à l’égard des fumeurs, fabricants de tabac, accès et disponibilité du tabac

INTRODUCTION

La consommation du tabac est considérée comme une cause évitable de mortalité dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a 4 millions de décès liés au tabagisme chaque année. Cette tendance devra s'accroître pour atteindre environ 10 millions de décès en 2030.

Les enquêtes « Global Youth Tobacco Survey » (GYTS) et « Global School Personnel Survey (Surveillance globale du tabac chez le Personnel » (GSPS) visent à rassembler les informations relatives à la prévalence du tabagisme en milieu scolaire, à évaluer les connaissances des enquêtés en matière de l'usage du tabac, de la publicité, d'accessibilité aux produits du tabac puis leurs attitudes et pratiques. Les programmes d'enseignements, les actions de lutte contre le tabagisme passif, les processus de cessation et de sevrage sont également évalués.

Ces enquêtes doivent être menées à intervalle réguliers afin de permettre de comparer les données des différentes années et apprécier avec exactitude l'impact des stratégies et des interventions de lutte antitabac dans le temps et dans l'espace, les appliquer là où elles sont utiles et les ajuster pour qu'elles donnent les meilleurs résultats possibles.

Aussi, en 2006 et en 2009, une équipe du Ministère en charge de la santé avec l'appui financier de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'appui technique du Center for Disease Control and Prevention (CDC) d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) a eu à effectuer deux fois les enquêtes GYTS et GSPS.

Le Congo dispose ainsi des données comparatives et représentatives au niveau national sur la prévalence du tabagisme aussi bien chez les jeunes que chez les adultes susceptibles de guider sa politique de lutte antitabac.

Ainsi le présent rapport comporte les données des enquêtes GYTS et GSPS organisées en mars 2009 sur toute l'étendue du territoire nationale.

D) - GYTS: GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY

1. OBJECTIFS

Les objectifs de l'enquête sont de :

- déterminer la prévalence du tabagisme chez les enfants scolarisés de 13 à 15 ans ;
- Evaluer leurs connaissances, attitudes et pratiques vis à vis du tabagisme et son impact ;
- Disposer des informations pour orienter les programmes et les plaidoyers visant au contrôle du tabagisme chez les jeunes.

2. PRESENTATION DU CONTENU DU GYTS.

Le GYTS contient des composantes suivantes :

- Le niveau d'utilisation du tabac ;
- L'âge d'initiation à l'utilisation de la cigarette ;
- Les niveaux du risque de devenir fumeur ;
- Les niveaux du risque à l'exposition à la fumée du tabac ;
- L'exposition à la publicité pour la consommation des produits du tabac ;
- L'identification des variables clés telles que les attitudes et les connaissances sur le comportement en matière du tabagisme pouvant être utilisées dans les programmes de prévention.

3. MATERIELS ET METHODE

3.1. Echantillonnage et type d'étude

L'enquête GYTS utilise un échantillonnage stratifié à 2 niveaux. Pour le premier niveau, les écoles ont été sélectionnées de façon randomisée dans l'ensemble des collèges du pays. Pour le second niveau, les classes ont été choisies de façon randomisée dans chaque école sélectionnée. Dans chaque classe retenue, tous les élèves présents au moment de l'enquête ont répondu au questionnaire.

3.1.1. Etape 1 : Sélection des écoles

La population cible de l'enquête GYTS est représentée par les jeunes âgés de 13 à 15 ans scolarisés dans les collèges du pays. Une liste de tous les collèges a été envoyée au Bureau du tabagisme et santé du CDC d'Atlanta où un échantillonnage a été réalisé. Cette liste comprenait les noms des collèges, le nombre des classes par collège et par niveau et le nombre d'élèves par classe de tout le pays. Les écoles ont été choisies de façon à tenir compte

de la taille des effectifs respectifs. Le résultat de cette sélection a donné le choix de 30 collèges dont 10 à Brazzaville, 10 à Pointe Noire et 10 dans le reste du pays

3.1.2. Etape 2 : sélection des classes et des élèves

Dans chaque école sélectionnée, un certain nombre de classes de niveau 6eme, 5eme, 4eme et 3eme ont été sélectionnées de façon randomisée c'est à dire chaque école en fonction du nombre de classes listées a eu une, deux, trois ou toutes de ses classes sélectionnées.

Ainsi 30 écoles ont été sélectionnées et 29 ont participées a l'enquête soit un taux de participation de 96,7%. Au total 64 classes ont été enquêtées. Dans chaque classe sélectionnée, tout élève présent au moment de l'enquête a été enquêté. Le nombre des élèves qui ont répondu au questionnaire était de 2 431 sur 3373 soit avec un taux de participation de 72,1% des inscrits. Le CDC a reçu et analysé les données récoltées. L'analyse statistique et de corrélation a utilisé un seuil de précision de 95%.

3.2. Outil de collecte des données : « le questionnaire »

Le questionnaire est du type auto-administré, toutes les questions comprises dans le questionnaire sont à choix multiples et sont relatives aux habitudes tabagiques : prévalence, accès, marque de cigarette et les autres produits de tabac, aux connaissances et attitudes, au tabagisme passif, à la cessation, à la publicité et média et à la réceptivité des enquêtés face à la publicité.

Le questionnaire a été prétexté dans un collège ayant tous les niveaux retenus par l'enquête.

3.3. 4.3 Exécution de l'enquête

L'enquête a été exécutée par les Enseignants évoluant dans ces établissements et supervisée les cadres du Ministère de la Santé, de l'Enseignement et des ONG.

L'anonymat a été respecté tout au long de l'enquête, le questionnaire ne possédant pas un item sur l'identité des élèves. Les données collectées ont envoyées au CDC d'Atlanta pour analyse.

La coordination a été assurée par :

- Mr Patrick Elvis Tsiba Egombo, Coordonnateur de recherche GYTS et GSPS 2009
- Dr Domingui Mathurin, Chef de Service de la Santé Mentale,
- Mme LIKIBI-BOHO Rosalie, Point Focal de lutte antitabac, Responsable de la Promotion de la Santé Mentale et de la Prévention de l'abus des drogues,

- Mr Georges Batala-MPondo, Directeur exécutif de l'Association Congolaise pour la Santé publique et Communautaire

4. Résultats

4.1. Taux de participation à l'enquête sur le tabagisme chez les jeunes

Tableau I : Etat de participation à l'enquête

Localité	Nombre d'écoles retenues	Nombre d'écoles ayant participées	Taux de participation des écoles	Nombre des élèves retenus	Nombre des élèves ayant participés	Taux de participation des élèves	Taux de réponse globale
Brazzaville	10	9	90%	1154	863	74,8%	67,3%
Pointe-Noire	10	10	100%	834	558	66,9%	66,9%
Reste du pays	10	10	100%	1385	1010	72,9%	72,9%
Total	30	29	96,7%	3373	2431	72,1%	69,7%

Toutes les écoles ciblées ont participé à l'enquête sauf à Brazzaville (29\30) mais tous les élèves présents à l'enquête n'ont pas répondu à toutes les questions. 2431 questionnaires ont été remplis dans 29 collèges. Le taux de participation des Collèges est de 72,1%. Le taux global de participation des élèves à l'enquête est de 69,7%.

Tableau II : Répartition par localité, par âge, par sexe et par niveau scolaire

Localité	< 13 ans	13 ans	14 ans	15 ans	+16 ans	Garçons	Filles	6 ^{ème}	5 ^{ème}	4 ^{ème}	3 ^{ème}
Brazzaville	19.0	18.2	18.7	19.7	24.4	48.5%	51.5%	26.4%	23.9%	20.7%	29.0%
Pointe Noire	23.8	14.2	18.3	18.6	24.9	50.8%	49.2%	58.1	12.5	10.0	19.3
Reste du pays	26.1	9.9	14.9	15.4	33.7	61.4%	38.6%	38.2%	23.8%	15.7%	22.3%
Nation	23.0	14.0	17.2	17.8	28.0	53.9%	46.1%	39.6	20.7	15.9	23.8

A Pointe Noire la plupart des répondants sont en classe de 6^{ème}

49% des répondants sont âgés de 13 à 15 ans, donc la sélection a été respectée

5-2 Tableau III : Prévalence/ Consommation des produits du tabac

Variables		% de Ceux qui ont déjà fumé au moins une cigarette/ une ou deux bouffées	Tout produit du tabac	Utilisation Courante de la cigarette	Autres produits du tabac	Non fumeurs susceptibles de le devenir
Age	13	16.2 (11.4 22.7)	28.6 (17.6 34.8)	9.7 (4.8 18.7)	13.3 (8.7 19.8)	20.3 (10.2 36.2)
	14	14.8 (10.4 20.7)	23.8 (17.9 31.4)	6.4 (4.0 10.0)	9.3 (5.5 15.4)	22.9 (10.8 42.1)
	15	20.1 (13.2 29.4)	21.5	8.8 (6.4 11.8)	7.9 (5.7 10.9)	22.9 (12.039.3)
	6 ^{ème}	15.7 (10.0 - 23.8)	8.3 (3.8 - 16.9)	8.3 (3.8 - 16.9)	25.2 (19.3 - 32.2)	32.2 (13.6 - 58.9)
	5 ^{ème}	18.3 (12.8 - 25.4)	8.7 (5.8 - 12.8)	8.7 (5.8 - 12.8)	20.8 (13.8 - 30.0)	11.6 (3.8 - 30.3)
	4 ^{ème}	18.5 (6.5 - 42.5)	7.1 (3.6 - 13.3)	7.1 (3.6 - 13.3)	10.7 (6.7 - 16.6)	14.8 (9.3 - 22.7)
	3 ^{ème}	20.1 (10.3 - 35.4)	9.2 (3.8 - 20.9)	9.2 (3.8 - 20.9)	13.6 (7.5 - 23.6)	16.7 (7.7 - 32.5)
Brazzaville	Total	20.1 (12.9 29.9)	23.9 (16.9 32.7)	9.4 (6.5 13.4)	9.1 (5.4 15.1)	16.0 (9.2 26.3)
	Garçons	31.4 (20.5 44.8)	28.9 (20.1 39.6)	13.7 (7.7 23.2)	10.5 (5.0 20.5)	10.8 (4.7 23.0)
	Filles	10.6 (6.0 17.9)	18.9 (10.1 32.7)	6.2 (3.0 12.6)	7.4 (3.1 16.9)	18.4 (12.1 27.0)
Pointe Noire	Total	12.2 (5.3 25.5)	18.0 (12.4 25.3)	4.6 (2.1 9.7)	6.7 (2.6 16.2)	24.3 (11.1 45.3)
	Garçons	14.4 (5.5 32.6)	19.7 (10.6 33.6)	3.7 (1.1 11.8)	5.8 (1.1 25.8)	23.4 (14.0 36.5)
	Filles	9.2 (3.5 22.2)	15.9 (10.6 23.3)	4.7 (1.6 13.1)	7.8 (3.915.1)	25.5 (8.4 56.0)
Reste du Pays	Total	17.4 (12.5 23.7)	30.7 (24.0 38.3)	9.7 (6.4 14.4)	23.3 (20.4 36.3)	28.5 (5.5 73.3)
	Garçons	23.0 (18.0 28.9)	32.5 (25.5 40.3)	14.6 (11.7 12.5)	27.4 (17.5 40.2)	21.8 (4.5 62.4)
	Filles	9.6 (3.4 24.4)	27.9 (13.9 48.0)	3.2 (2.1 47.7)	27.3 (13.6 47.4)	35.8 (6.3 82.3)
Nation	Total	17.2 (13.2 ,22,0)	24.3 (20.7 28.4)	8.2 (12.9 29.9)	9.9 (7.1 13.8)	22.1 (12.5 36.2)
	Garçons	24.0 (18,2 30,9)	27.6 (22.7 33.2)	11.3 (8.2 15.3)	11.1 (7.3 16.3)	18.4 (10.5 30.2)
	Filles	9.9 (6,8 14,3)	20.4 (23.1 26.8)	5.0 (3.1 8.1)	8.6 (5.1 14.1)	25.1 (13.5 41.7)

De ce tableau, nous avons ce qui suit :

La prévalence tabagique est plus élevée chez les élèves de 15ans (20,1%) et les élèves de la classe de la 3^{ème} sont les plus concernés (20,1%)

Elle est plus élevée chez à Brazzaville (20,1%) que dans les autres localités

La consommation des autres produits du tabac est remarquable chez les élèves de la 6^{ème} (25,2%) et de la 5^{ème} (20,8%) et les élèves âgés de 13 ans sont plus concernés (13,3%)

Les élèves de la 6^{ème} ont plus manifesté le désir de devenir fumeurs l'année prochaine (32,2%)

Tout produit du tabac est plus utilisé à l'intérieur du pays (30,7%) suivi de Brazzaville (23,9%). Par contre le désir de devenir fumeur est accentué à l'intérieur du pays (28,5%) et à Pointe-Noire (24,3%)

Ceci peu s'expliquer par le manque des campagnes de sensibilisation lors de la journée mondiale sans tabac réalisée souvent à Brazzaville seulement.

Tableau IV : Programme scolaire

Variables		% de ceux qui ont reçu des enseignements sur les dangers du tabagisme	% de ceux qui ont discuté des raisons pour lesquelles les gens de leur âge fument	% de ceux qui ont reçu des enseignements sur les effets généraux du tabagisme
Age	13	35.4 (28.5 48.2)	15.6 (11.5 20.8)	28.0 (19.0 39.3)
	14	42.2 (36.1 57.2)	18.8 (12.2 27.8)	28.5 (19.0 40.4)
	15	45.7	22.6 (15.5 31.9)	35.4 (26.2 45.9)
BRAZZAVILLE	Total	38.8 (22.9 57.6)	19.4 (13.6 26.9)	35.1 (18.9 55.5)
	Garçons	43.5 (28.6 59.7)	19.6 (11.4 31.4)	36.7 (19.0 58.8)
	Filles	35.4 (17.2 59.2)	20.1 (14.4 27.4)	34.6 (17.4 57.1)
POINTE-NOIRE	Total	33.8 (26.1 42.4)	17.8 (12.4 25.0)	28.2 (24.3 32.4)
	Garçons	36.3 (25.6 48.4)	18.0 (13.9 23.0)	36.7 (23.7 51.9)
	Filles	32.3 (17.9 51.1)	17.0 (9.2 29.1)	19.8 (10.0 35.7)
RESTE DU PAYS	Total	52.3 (26.2 77.2)	20.6 (7.7 44.4)	27.8 (9.3 59.2)
	Garçons	50.6 (32.2 68.8)	22.9 (8.5 48.6)	26.9 (8.8 58.4)
	Filles	56.8 (20.2 87.3)	17.4 (5.0 45.7)	27.9 (7.7 64.0)
NATION	Total	41.5 (31.4 52.3)	19.3 (14.5 25.3)	30.9 (22.3 41.0)
	Garçons	43.9 (26.6 52.0)	20.3 (14.3 27.9)	33.3 (23.6 44.5)
	Filles	40.1 (24.4 55.3)	18.5 (13.5 24.8)	28.5 (18.9 18.9)

Quant au programme scolaire sur le tabagisme, environ 1 élève sur 2 au Congo, précisément 41,5%, a été sensibilisé sur les dangers du tabac, 19,3% seulement ont eu à discuter des raisons pour lesquelles les gens de leur âge fument. Les garçons sont les plus intéressés que les filles par ces discussions. Peu d'élèves reçoivent les enseignements sur les effets généraux du tabagisme.

Tableau V : Cessation de fumer

		% de ceux qui désirent arrêter	% de ceux qui essayent d'arrêter
	13	84.6 (47.7 97.1)	75.9 (31.2 95.6)
	14	89.7 (47.6 98.8)	75.5 (50.8 90.2)
	15	91.2 (54.5 98.9)	82.7 (45.4 96.5)
Brazzaville	Total	71.9 (39.3 91.0)	54.1 (13.4 90.0)
	Garçons	81.6 (44.2 96.2)	63.4 (12.8 95.3)
	Filles	66.6 (2.9 94.2)	20.4 (0.7 90.7)
Pointe-Noire	Total	NA	NA
	Garçons	/	/
	Filles	/	/
Reste du pays	Total	91.4 (32.6 99.6)	91,4 (32,6 99,6)
	Garçons	89.3 (26.5 99.5)	89,3 (26,5 99,5)
	Filles	/	100
Nation	Total	88.7 (75.1 95.3)	78.4 (51.1 92.6)
	Garçons	92.5 (83.3 96.8)	81.2 (50.4 94.8)
	Filles	73.8 (32.1 94.4)	66.9 (16.4 95.4)

Ce tableau nous montre que ceux qui fument ont le désir d'arrêter (887%°), d'autres l'ont même essayé.

Tableau VI : Environnement tabagique

Variable		Exposé à la fumée des autres dans leurs maisons	Exposé à la fumée des autres dans les lieux publics	% de ceux qui pensent que fumer devrait être interdit dans les endroits publics	Ceux qui ont un ou plusieurs parents qui fument	Ceux qui ont la plupart de leurs amis, ou tous qui fument	% de ceux qui Pensent certainement que la fumée des autres est nuisible
	13	20.9 (15.4 - 27.8)	41.3 (30.6 - 52.9)	77.6 (68.3 - 84.8)	14.2 (9.7 - 20.3)	8.6 (4.3 - 16.7)	41.0 (31.7 - 54.0)
	14	21.2 (15.4 - 28.4)	45.1 (34.3 - 56.4)	79.4 (72.2 - 85.2)	11.2 (7.5 - 16.4)	5.7 (3.4 - 9.6)	44.4 (37.4 - 57.9)
	15	24.5 (19.4 - 30.5)	46.1 (36.5 - 56.0)	78.6 (69.2 - 85.7)	14.8 (10.5 - 20.5)	6.6 (3.5 - 12.3)	46.4
	6 ^{ème}	26.0 (20.6 - 32.3)	47.2 (33.0 - 62.0)	75.4 (64.0 - 84.0)	/	/	/
	5 ^{ème}	22.5 (15.6 - 31.2)	36.7 (24.1 - 51.4)	79.1 (69.1 - 86.5)	/	/	/
	4 ^{ème}	18.3 (14.2 - 23.1)	48.7 (36.5 - 61.2)	82.1 (71.6 - 89.3)	/	/	/
	3 ^{ème}	16.5 (9.5 - 27.0)	44.6 (30.0 - 60.1)	86.4 (72.9 - 93.8)	/	/	/
Brazzaville	Total	19.3 (13.5 - 26.8)	46.5 (28.6 - 65.9)	85.8 (75.1 - 92.4)	56.7 (39.7 - 72.2)	10.0 (5.6 - 17.2)	4.3 (1.2 - 14.4)
	Garçons	17.4 (9.5 - 29.7)	49.4 (29.9 - 69.2)	85.1 (77.2 - 90.6)	62.2 (47.2 - 75.2)	8.2 (3.8 - 16.8)	4.9 (0.9 - 22.1)
	Filles	21.0 (11.7 - 34.6)	44.4 (25.1 - 65.6)	86.7 (72.3 - 94.2)	52.5 (34.4 - 69.9)	11.4 (6.0 - 20.5)	3.4 (1.1 - 10.0)
Pointe-Noire	Total	22.9 (16.9 - 30.3)	38.8 (23.8 - 56.3)	71.4 (60.3 - 80.4)	14.9 (9.9 - 21.9)	7.6 (5.1 - 11.2)	34.7 (19.0 - 54.5)
	Garçons	27.7 (19.4 - 37.9)	46.1 (30.2 - 62.8)	78.0 (66.4 - 86.5)	17.9 (10.0 - 30.0)	11.3 (6.4 - 19.1)	36.4 (24.6 - 50.2)
	Filles	18.0 (10.5 - 29.0)	30.7 (14.9 - 52.9)	66.2	10.4 (7.4 - 14.3)	2.7 (0.5 - 12.7)	33.9 (14.5 - 53.1)

Reste du pays	Total	25,8 (15,4 39,9)	46.7 (24.3 70.4)	75.3 (53.3 9.1)	16.5 (9.5 27.2)	9.7 (3.5 23.9)	36.2 (22.2 53.1)
	Garçons	30,3 (17,1 47,7)	44.6 (27.3 63.4)	72.8(50.8 87.4)	19.1 (5.6 32.1)	11.3 (3.6 30.2)	39.4 (25.6 55.2)
	Filles	19,2 (11,9 29,4)	48.9 (17.6 81.1 0)	81.4 (56.4 93.7)	11.4 (7.5 22.0)	7.9 (2.5 22.4)	32.9 (18.8 50.9)
Nation	Total	22.3 (18.4 - 26.8)	44.4 (34.9 - 54.3)	78.6 (71.3 84.4)	13.4 (10.4 17.0)	6.9 (4.5 10.5)	44.2 (34.6 54.1)
	Garçons	24.7 (18.9 - 31.6)	46.8 (37.9 - 56.0)	78.9 (71.7 84.7)	14.6 (10.7 19.6)	8.9 (5.3 14.5)	47.2 (31.4 56.1)
	Filles	19.6 (14.9 - 25.4)	41.5 (29.5 - 54.7)	79.3 (69.2 - 86.7)	11.1 (8.3 14.7)	4.4 (2.5 7.5)	41.8 (29.1 53.0)

Le tableau montre que 4/10 sont exposés à la fumée dans les lieux publics et la majorité pensent qu'il faut interdire de fumer dans les lieux publics

Tableau VII : Connaissances et Attitudes à l'égard des fumeurs

Variable		% de ceux qui pensent que les garçons qui fument ont plus d'amis	% de ceux qui pensent que les filles qui fument ont plus d'amis	% de ceux qui pensent que les garçons qui fument sont plus attirants	% de ceux qui pensent que les filles qui fument sont plus attirantes
	13	33.4 (25.4 42.6)	25.7 (19.2 33.5)	26.6 (18.7 36.3)	27.5 (18.1 39.3)
	14	38.6 (30.7 47.0)	23.0 (14.8 33.9)	25.7 (16.9 37.0)	28.8 (19.9 39.8)
	15	34.8 (30.0 39.8)	25.0 (18.8 32.3)	27.1 (20.4 35.0)	29.7 (22.2 38.6)
	Total	33.1 (21.6 47.1)	24.2 (13.5 39.7)	23.3 (13.2 37.8)	24.9 (10.9 47.2)
	Garçons	27.3 (20.7 57.1)	17.1 (10.4 27.8)	21.0 (9.0 41.7)	22.0 (6.9 51.7)
	Filles	37.0 (20.7 57.1)	30.2 (14.9 51.6)	15.9 (14.8 41.2)	28.1 (13.5 49.4)

Brazzaville					
Pointe-Noire	Total	32.5 (23.9 42.6)	23.7 (12.4 40.4)	25.0 (14.9 38.8)	30.6 (20.7 42.7)
	Garçons	39.1 (31.7 47.1)	24.8 (15.3 37.5)	23.0 (12.6 38.3)	35.4 (24.3 48.2)
	Filles	26.9 (11.3 51.4)	23.3 (9.9 45.4)	26.1 (15.2 41.1)	26.1 (10.7 51.1)
Reste du pays	Total	42.1 (29.7 55.6)	25.5 (13.3 43.3)	31.9 (15.2 55.2)	32.2 (15.2 55.7)
	Garçons	44.3 (35.6 53.3)	25.1 (14.2 40.4)	32.8 (18.4 51.4)	32.1 (15.2 55.6)
	Filles	38.5 (20.2 60.8)	25.6 (9.7 52.3)	29.4 (7.9 66.9)	31.2 (9.6 66.0)
Nation	Total	35.7 (30.2 41.7)	24.5 (18.5 31.9)	26.4 (19.9 34.1)	28.8 (20.9 38.1)
	Garçons	36.4 (32.1 41.0)	22.0 (17.2 27.6)	25.6 (18.7 34.1)	29.2 (19.9 40.6)
	Filles	34.4 (25.3 44.9)	26.9 (18.3 37.7)	26.8 (18.9 36.7)	28.3 (18.9 40.1)

Le tiers des élèves pensent que les hommes qui fument ont plus d'amis par contre au niveau de l'attirance, les pensées sont les mêmes chez les garçons que chez les filles.

Tableau VIII : Médias et Publicité

Variable		% de ceux qui ont suivi des messages antitabac dans les médias	% de ceux qui ont vu de la publicité du tabac sur les banderoles	% d'élèves ayant suivi des messages pro- tabac dans les journaux ou magazines	% de ceux qui possèdent des objets avec un logo de marque de cigarette	% de ceux ayant reçu des cigarettes gratuites par les Représentants des Compagnies du tabac
	13	59.3 (50.5 67.5)	43.1 (33.5 53.3)	34.4 (25.8 44.3)	13.8 (9.5 19.5)	9.1 (5.1 15.5)
	14	60.1 (50.2 69.2)	42.8 (30.4 56.2)	33.8 (24.5 44.7)	15.9 (9.9 24.3)	9.6 (5.8 15.7)
	15	54.9 (47.9 61.6)	37.8 (30.0 46.3)	30.4 (21.7 40.8)	10.9 (7.3 15.9)	5.3 (3.2 8.7)
	6 ^{ème}		43.0 (27.6 - 60.0)	28.8 (17.1 - 44.2)	16.1 (10.7 - 23.6)	6.3 (2.8 - 13.5)
	5 ^{ème}		43.3 (26.4 - 62.0)	42.1 (28.0 - 57.6)	12.7 (9.0 - 17.4)	10.9 (6.3 - 18.3)
	4 ^{ème}		32.5 (23.2 - 43.5)	34.3 (24.3 - 45.9)	9.1 (4.4 - 17.7)	5.5 (3.7 - 8.0)

	3 ^{ème}		36.8 (30.0 - 44.1)	27.0 (18.0 - 38.4)	11.1 (6.0 - 19.7)	9.4 (5.1 - 16.6)
Brazzaville	Total	62.7 (49.7 73.9)		34.7 (21.5 50.6)	10.5 (4.3 23.4)	8,2(4.0 16.0)
	Garçons	62.5 (46.2 76.3)	37.8 (24.0 53.9)	34.0 (19.5 52.3)	11.0 (3.5 29.7)	8.7 (3.8 18.8)
	Filles	63.6 (43.8 79.6)	43.2 (33.2 53.7)	35.3 (21.4 52.4)	10.6 (4.6 22.6)	7.5 (3.7 18.2)
Pointe-Noire	Total	56.9 (48.3 65.0)	36.0 (21.8 53.1)	37.6 (22.7 55.2)	14.8 (11.7 18.6)	5.3 (1.9 14.1)
	Garçons	60.4 (53.8 66.6)	40.8 (29.4 53.4)	34.4 (15.3 60.4)	18.7 (12.3 27.4)	4.7 (0.7 25.8)
	Filles	53.1 (37.4 68.3)	30.6 (14.0 54.4)	38.9 (23.2 57.3)	10.8 (7.1 16.1)	5.1 (2.2 11.5)
Reste du pays	Total	52.6 (35.3 69.3)	46.2 (24.9 69.1)	25.9 (10.9 49.9)	16.2 (8.4 28.9)	10.0 (3.9 23.1)
	Garçons	50.1 (45.3 55.0)	41.1 (24.3 60.3)	23.1 (12.0 39.8)	15.5 (7.5 29.2)	6.7 (3.2 13.7)
	Filles	52.4 (20.2 82.7)	51.0 (21.7 79.6)	26.7 (6.9 63.9)	15.9 (5.1 40.3)	12.6 (3.0 40.0)
Nation	Total	58.0 (51.5 64.2)	41.1 (32.6 50.1)	32.8 (25.1 41.6)	13.5 (10.0 18.0)	7.9 (5.2 11.9)
	Garçons	57.6 (52.1 63.0)	39.8 (32.3 47.8)	30.3 (22.6 39.5)	14.7 (10.0 21.0)	6.9 (4.3 11.0)
	Filles	57.6 (46.2 68.2)	41.5 (30.9 53.0)	34.1 (24.7 45.0)	12.1 (8.1 17.5)	8.1 (5.0 13.1)

Plus de la moitié des élèves enquêtés ont suivi dans les medias les messages antitabac dans toutes les localités. Par contre on note l'existence encore des messages faisant la promotion du tabac dans les journaux et les magazines et les banderoles.

Tableau IX : Accès et disponibilité

Variables		% des fumeurs courants qui fument habituellement à la maison	% des fumeurs courants qui ont acheté des cigarettes dans un magasin	% des fumeurs courants qui ont acheté des cigarettes dans un magasin qui n'ont pas été refusées en raison de leur âge
	13	50.4(24.7 75.9)	39.8(14.8 71.5)	32.2(7.5 73.7)
	14	54.7(28.9 78.2)	39.5(19.3 64.0)	72.4(24.7 95.5)
	15	31.1(12.1 59.8)	34.7(23.2 48.3)	46.7(13.2 83.5)
BRAZZAVILLE	Total	42.6(25.2 61.8)	27.9(8.6 67.9)	58.2(15.9 91.2)
	Garçons	23.6(9.2 48.3)	29.4(7.6 67.9)	48.3(9.8 88.9)
	Filles	79.2(35.4 96.4)	25.1(7.5 57.9)	100
POINTE-NOIRE	Total	33.6(6.4 78.9)	52.5(17.3 85.4)	70.6(35.5 91.3)
	Garçons	0.0	31.5(12.2 60.2)	00
	Filles	60.1(23.1 88.3)	59.6(18.7 90.4)	100
RESTE DU PAYS	Total	49.0(9.7 89.6)	44.1(34.6 54.0)	27.7(1.2 92.4)
	Garçons	48.3(9.2 89.6)	53.1(40.4 65.3)	27.7(1.2 92.4)
	Filles	63.6(8.0 97.2)	00	.
NATION	Total	43.7(25.5 63.7)	37.7(25.2 52.1)	47.6(19.2 77.6)
	Garçons	32.8(14.5 58.6)	40.3(26.5 56)	32.0(8.3 71.0)
	Filles	71.0(48.2 86.6)	29.9(14.3 52.2)	100

Les filles fument plus à la maison que les garçons quelle que soit la localité. Moins d'élèves achètent leurs cigarettes dans les magasins sauf à pointe Noire. La cigarette est vendue librement sans qu'on regarde l'âge le confirme l'enquête.

I) COMPARAISON des données GYTS 2006 et 2009

Tableau X : Prévalence – Congo 2006 et 2009 (Ages 13-15)

Prévalence	2006			2009		
	Total	Garçons	filles	Total	Garçons	filles
% de Ceux qui ont déjà fumé au moins une cigarette/ une ou deux bouffées	22.9 (17.3 - 27.5)	26.6 (20.6 - 33.6)	17.2 (12.1 - 23.8)	17.2 (13.2 - 22.0)	24.0 (18.2 - 30.9)	9.9 (6.8 - 14.3)
% de ceux qui pris leur cigarette avant l'âge de 10ans	20.9 (15.1 - 28.1)	20.4 (13.1 - 30.3)	23.8 (14.7 - 36.1)	16.3 (10.2 - 24.8)	15.4 (8.3 - 26.8)	17.2 (5.9 - 40.9)
Utilisation Courante de la cigarette	11.4 (7.7 - 16.6)	15.0 (9.8 - 22.2)	8.1 (4.3 - 14.7)	8.2 (6.3 - 10.5)	11.3 (8.2 - 15.3)	5.0 (3.1 - 8.1)
Tout produit du tabac	16.7 (12.7 - 21.6)	15.6 (12.1 - 19.9)	17.7 (12.5 - 24.4)	20.0 (16.3 - 24.3)	22.0 (17.0 - 27.9)	17.4 (12.5 - 23.6)
Non fumeurs susceptibles de le devenir dans un an	15.1 (12.0 - 18.8)	17.7 (12.7 - 24.0)	12.9 (9.4 - 17.3)	22.1 (12.5 - 36.2)	18.4 (10.5 - 30.2)	25.1 (13.5 - 41.7)

Nous constatons que l'usage de la cigarette a baissé de 22,9% à 17,2% avec une baisse considérable chez les filles 17,2% à 9,9%.

L'initiation au tabagisme avant 10 ans aussi a baissé de 20,9 à 16,3%

La consommation de la cigarette a diminué comme l'indique le tableau comparatif ; par contre la consommation des autres produits du tabac a augmenté d'où nécessité de faire une étude CAP afin de les déterminer pour mieux orienter la lutte.

L'envie de devenir un fumeur d'ici un an a été souligné par les élèves surtout chez les jeunes filles. C'est ainsi que le Ministère de l'enseignement, de la jeunesse et droit civique doivent s'engager dans cette lutte.

Tableau XI : Facteurs influençant le tabagisme au Congo 2006 et 2009 chez les jeunes de 13 à 15 ans

Facteurs	2006			2009		
	Total	Garçons	filles	Total	Garçons	filles
Environnement tabagique						
Ceux qui ont un ou plusieurs parents qui fument	15.4 (12.5 - 18.7)	16.6 (12.3 - 21.9)	13.7 (10.4 - 17.7)	13.4 (10.4 - 17.0)	14.6 (10.7 - 19.6)	11.1 (8.3 - 14.7)
% ceux qui ont les amis qui fument	6.6 (5.6 - 7.8)	6.4 (4.6 - 9.0)	6.6 (5.1 - 8.5)	6.9 (4.5 - 10.5)	8.9 (5.3 - 14.5)	4.4 (2.5 - 7.5)
Exposé à la fumée des autres dans les lieux publics	44.8 (39.9 - 49.8)	50.5 (45.4 - 55.6)	40.6 (34.5 - 46.9)	44.4 (34.9 - 54.3)	46.8 (37.9 - 56.0)	41.5 (29.5 - 54.7)
% de ceux qui pensent que fumer devrait être interdit dans les endroits publics	70.3 (65.1 - 75.1)	70.5 (66.3 - 74.3)	70.7 (62.8 - 77.5)	78.6 (71.3 - 84.4)	78.9 (71.7 - 84.7)	79.3 (69.2 - 86.7)
Programme scolaire						
% de ceux qui ont reçu des enseignements sur les dangers du tabagisme	48.6 (40.3 - 57.1)	51.3 (42.7 - 59.9)	46.2 (36.3 - 56.5)	41.5 (31.4 - 52.3)	43.9 (36.1 - 52.0)	40.1 (26.6 - 55.3)
Média et publicité						
messages antitabac dans les médias	63.2 (56.4 - 69.6)	64.3 (53.4 - 73.9)	63.2 (58.8 - 67.3)	58.0 (51.5 - 64.2)	57.6 (52.1 - 63.0)	57.6 (46.2 - 68.2)
Publicité du tabac sur les banderoles	52.8 (46.0 - 59.5)	53.9 (46.1 - 61.6)	51.3 (43.3 - 59.2)	41.1 (32.6 - 50.1)	39.8 (32.3 - 47.8)	41.5 (30.9 - 53.0)
messages pro- tabac dans les journaux ou magazines	45.2 (41.2 - 49.2)	45.4 (39.8 - 51.2)	45.3 (41.1 - 49.6)	32.8 (25.1 - 41.6)	30.3 (22.6 - 39.5)	34.1 (24.7 - 45.0)
Possession des objets avec un logo de marque de cigarette	21.7 (17.4 - 26.8)	24.3 (19.7 - 29.6)	18.8 (14.1 - 24.7)	13.5 (10.0 - 18.0)	14.7 (10.0 - 21.0)	12.1 (8.1 - 17.5)
cessation						
Désir d'arrêter	77.1 (61.9 - 87.4)	84.3 (71.2 - 92.1)	*	88.7 (75.1 - 95.3)	*	*
Prise de la cigarette tôt le matin	12.5 (4.9 - 28.5)	15.7 (5.3 - 38.3)	*	34.8 (8.9 - 74.4)	*	*
Accès et disponibilité						
Achat des cigarettes dans un magasin et dont l'âge n'était pas demandé	49.7 (26.8 - 72.8)	*	*	*	*	*
Réception gratuite des cigarettes par les Représentants des Compagnies du tabac	11.0 (8.8 - 13.7)	12.1 (9.5 - 15.3)	9.4 (6.6 - 13.1)	7.9 (5.2 - 11.9)	6.9 (4.3 - 11.0)	8.1 (5.0 - 13.1)

Le tabagisme passif

Les élèves sont exposés au tabagisme passif tant à la maison qu'aux lieux publics. La majorité souhaite l'interdiction de fumer dans les lieux publics

L'existence de la publicité

Nous constatons aussi que les fabricants des produits du tabac continue la publicité avec les banderoles, parfois les panneaux, d'où il faut vulgariser la convention cadre ratifié par le pays et à la promulgation de la loi contre le tabagisme votée déjà par nos parlementaires.

Le manque de programme de sevrage

Beaucoup d'élèves enquêtées veulent arrêter de fumer d'autres l'ont déjà essayé. Pour cela il faut penser à la prise en charge des fumeurs (le sevrage)

Le programme scolaire

Les élèves enquêtés confirment avoir été informé sur les effets ou les dangers du tabac à l'école mais cette sensibilisation est insuffisante ; d'où il faut l'intensifier et inclure dans le module de lutte antitabac dans le programme scolaire

L'accessibilité aux produits du tabac

L'accessibilité aux produits du tabac ne sont pas contraignants dans le pays ; on assiste encore à la distribution gratuite de la cigarette par les compagnies bien que cette distribution a baissée. Les efforts doivent être doublés et les textes d'application de la loi contre le tabagisme doivent être élaborés.

II)-GSPS: L'enquête sur le tabagisme des personnels exerçant en milieu scolaire

L'Enquête sur le Tabagisme du personnel exerçant en milieu scolaire (Global School Personnel Survey : GSPS) organisée courant mois de mars 2009, concomitamment avec l'enquête GYTS , a concerné les adultes travaillants dans l'établissement scolaire et se trouvant dans l'établissement au moment du déroulement de l'enquête GYTS (Global youth Tobacco Survey), ses résultats font apparaître des données sur la prévalence de la consommation de la cigarette et des autres produits du tabac, ainsi que des informations sur le comportement tabagique et les habitudes du personnel selon leur profil, âge et position vis-à-vis des élèves (enseignants, administrateurs, ouvriers...). Ces données peuvent être prise en compte pour l'élaboration d'un programme complet de lutte contre le tabac en milieu scolaire.

542 adultes ont répondu au questionnaire de l'enquête, avec un sexe ratio (homme / femme) de $345/107 = 542$

La distribution selon l'âge est la suivante :

<i>Tranche d'âge</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Pourcentages</i>
Non précisée	0	0.00%
< 19	0	0.00%
20 - 29	63	17,3%
30 - 39	106	33,6%
40 - 49	120	25,4%
50 - 59	161	22,5%
60 ans et plus	3	1,1%
Total	542	100,00%

La distribution selon le profil :

<i>Profil</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Pourcentages</i>
Administrateurs (Directeur)	109	17,7%
Enseignants	334	82,3%
Equipe de santé scolaire	0	0.00%
Equipe administrative	0	0.00%
Autre profil	0	0.00%
Manquants	0	0.00%
Total	542	100%

16.0%, du personnel interrogé considère que l'éducation à la santé est l'une de ses responsabilités primaires

50.7% pensent qu'ils peuvent d'un moment à un autre faire passer des messages d'éducation à la santé et que pour 33,4%. cela ne le concerne pas

Prévalence:

25,1% ont déjà fumé ou fument des cigarettes ;

24,1% Utilisation de tout produit du tabac;

7,2% Utilisation Courante de la cigarette;

19,6% Utilisation des autres produits du tabac;

3,7% ont fumé d'autres accessoires l'an passé

Politique d'interdiction de fumer à l'école :

98,4% approuvent que l'école devait avoir une loi interdisant aux élèves de fumer à l'école

76,9% déclarent avoir une politique interdisant aux élèves de fumer à l'école

96,9% approuvent que l'école devait avoir une loi interdisant au personnel de fumer à l'école;

73,4% approuvent que l'école devait avoir une loi interdisant personnel de fumer à l'école;

88,1% demandent le renforcement des lois interdisant l'usage du tabac ou des produits du tabac à l'école aux élèves et au personnel.

Programme scolaire

53,5% sont pour inclure la prévention du tabagisme dans le curricula

96,8% considèrent que les enseignants devaient être formés pour aider les élèves à lutter contre le tabagisme ;

88,0% considèrent que l'école devait avoir une stratégie contre le tabagisme

14,6% confirment avoir reçu des enseignements sur le tabagisme des jeunes

9,3% des écoles ont des programmes de lutte contre le tabagisme

Attitudes

92,3 sont pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics ;

95,7% pensent que la fumée des autres est nocive

74,6% pensent que les professeurs qui fument influencent les jeunes dans l'usage de l'usage du tabac

83,4 % pensent qu'il faut interdire complètement la publicité du tabac et de ses produits.

79,1% pensent que le prix du tabac doit être majoré

78,3% pensent que les industries du tabac encouragent volontairement les jeunes à utiliser le tabac

Tableau XII : Données comparatives de GSPS 2006 et 2009

	2006			2009		
	Total	administrateurs	Enseignants	Total	administrateurs	Enseignants
Prévalence						
% de ceux qui ont déjà fumé ou fument des cigarettes	34,4%	59,2%	31,6%	25,1%	48,7%	20,2%
Utilisation de tout produit du tabac	9,4	5,6%	9,9%	24,1%	26,7%	23,6%
Utilisation Courante de la cigarette	5,4%	5,5%	5,4%	7,2%	12,2%	6,2%
Utilisation des autres produits du tabac	4,7%	0,6%	5,4%	19,6%	23,7%	18,8%
% de ceux qui ont fumé d'autres accessoires l'an passé	0,9%	1,3%	0,9%	3,7%	8,6%	2,6%
Politique						
avoir une loi interdisant aux élèves de fumer à l'école			96,7%			98,4%
Avoir une loi interdisant le personnel de fumer à l'école			83,1%			73,4%
renforcement des lois interdisant l'usage du tabac ou de produits du tabac à l'école aux élèves et au personnel.			81,9%			88,1%
Programme scolaire						
avoir reçu des enseignements sur le tabagisme des jeunes			18,4%			14,6%
écoles ont des programmes de lutte contre le tabagisme			9,3%			9,3%
inclure la prévention du tabagisme dans le curricula			52,3%			53,5%
Attitudes						
interdiction complète de la publicité du tabac et de ses produits			80,1%			83,4 %
l'interdiction de fumer dans les lieux publics			85,8%			92,3
professeurs qui fument influence les jeunes dans l'usage de l'usage du tabac			65,6%			74,6%

Nous constatons une augmentation dans l'utilisation de la cigarette (5,4% à 7, 2%), de tout produit du tabac (9,4% à 24, 1%) et des autres produits du tabac (4,7% à 19, 6%) par rapport à 2006. Les Autres agents utilisent plus la cigarette et les produits du tabac que les enseignants.

Peu des écoles ont des programmes sur la lutte antitabac (9,3%) pour les deux années

L'interdiction de fumer dans les lieux publics est demandé par la majorité des enquêtés dans les deux années (chez les élèves que chez le personnel évoluant au sein de ces établissements)

III) DISCUSSION

Le principal objectif de la lutte contre le tabagisme est de protéger la santé de la population contre les effets dévastateurs de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac.

Le fait de disposer de données précises permet de comprendre les problèmes causés par le tabac et de répartir les ressources efficacement pour obtenir l'impact souhaité.

Le programme MPOWER se concentre sur les points suivants :

- M- surveiller le tabagisme et évaluer l'impact des politiques de prévention du tabagisme
- P- Protéger le public de la fumée secondaire
- O- Proposer à tous les fumeurs de l'aide pour arrêter de fumer
- W- Mettre en garde et sensibiliser efficacement chaque personne aux dangers du tabagisme par le biais des mises en garde sanitaires marquantes sous forme d'illustrations graphiques; et des - campagnes médiatiques de sensibilisation du public qui frappent fort
- E- Adopter et appliquer des interdictions totales de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac; et - avoir recours à des termes tendancieux tels que *légère* ou *à faible teneur en goudrons*.
- R- Augmenter le prix de tous les produits du tabac en majorant la taxation du tabac

La convention cadre pour la lutte antitabac comprend des articles relatifs à chacune des interventions mentionnées dans le MPOWER

Ainsi, par rapport aux résultats de GYTS et GSPS nous avons ce qui suit :

La protection

L'article 8 de la convention traite de la protection contre l'exposition à la fumée du tabac. Chaque partie adopte et applique des mesures prévoyant une protection contre l'exposition à la fumée du tabac.

Les données de GYTS et GSPS montrent que 4/10 des élèves sont exposés à la fumée dans les lieux publics et la majorité pensent qu'il faut interdire de fumer dans ces lieux.

92,3% du personnel est pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

Donc la création des espaces sans tabac est une priorité. Ensuite, la promulgation de la loi contre le tabagisme est indispensable.

La publicité, la promotion et le parrainage

L'article 13 de la convention exige que les Parties interdisent totalement la publicité du tabac, la promotion et le parrainage. Le programme MPOWER résume l'interdiction de la publicité à la radio, les journaux, la télé les panneaux d'affiche. le Congo n'a pas de loi sur la publicité mais il existe une note circulaire No 00392/MSP/CAB du 24 février 2006 : à l'attention des fabricants, importateurs et revendeurs de produits du tabac qui n'est pas vulgarisée. Les données de GYTS ont montré l'existence des messages pro tabac dans les journaux, les magazines et sur les banderoles. 45,2% en 2006 et 32,8% en 2009.

Les fabricants du tabac continuent à distribuer les objets avec le logo de marque de cigarette bien qu'il ya baisse en 2009 (21,7% à 13,5%)

La Cessation

L'article 14 de la convention exige que les Parties s'efforcent de concevoir et de mettre en œuvre des programmes efficaces permettant à promouvoir le sevrage tabagique.

Pour le rapport MPOWER, les pays doivent mettre en place des programmes à faible coût des traitements pour ceux qui veulent arrêter, et rendre disponible le remplacement de la nicotine (NRT) et de bupropion disponible dans les pharmacies.

Les données de GYTS ont montré que le désir d'arrêter de fumer est important car il y a augmentation eu augmentation par rapport en 2006 de 77,1% à 88,7%

Au Congo il n'y a qu'une pharmacie qui dispose le NRT et ceci sur commande. la liste des médicaments essentiels qui existe dans le pays ne tient pas compte du sevrage tabagique.

Pour cela une table ronde avec les pharmaciens sur le sevrage tabagique serait mieux

Le programme scolaire

L'article 12 de la convention traite de la question de l'éducation, la communication la formation et la sensibilisation du public.

Chaque partie s'efforce de promouvoir et de renforcer la sensibilisation du public en utilisant tous les outils disponibles

Les résultats de GYTS ont indiqué que 41,5% des élèves ont reçu les enseignements sur les dangers du tabac

Dans le GSPS, 14,6% des enseignants ont reçu des enseignements sur le tabagisme des jeunes et 9,3% seulement des écoles ont le programme scolaire sur la lutte contre le tabagisme.

Ces résultats sont vraiment insuffisants.

IV. CONCLUSION:

Au terme de cette enquête, nous pouvons confirmer que le tabagisme en milieu scolaire est bel et bien un problème préoccupant au Congo car les enfants en font usage avant l'âge de 10 ans.

La prévalence est passée de 22,9% à 17,2%. Cette diminution est plus remarquable chez les filles que chez les garçons. (17,2% à 9,9%)

Cette consommation du tabac/ cigarette, n'est pas seulement une spécificité masculine même si la proportion de fumeurs est plus remarquable chez les garçons que chez les filles.

La consommation de la cigarette a baissé au détriment des autres produits du tabac de 11,4 % à 8,2%.

Et les autres produits du tabac ont augmenté de 16,7 à 20,0% surtout en campagne.

En dehors du tabac, notre étude a montré également que les jeunes scolarisés font usage de tous les autres produits du tabac sous une forme ou une autre quel que soit l'âge, le sexe, le niveau scolaire ou le site étudié. Cet usage suit la même tendance que la consommation de la cigarette en ce qui concerne l'âge, le sexe et le niveau d'étude.. Globalement, 1 élève sur 5 (21.1% de jeunes) consomme tous les autres produits du tabac.

Les enseignements sur les méfaits du tabac sont bien intégrés dans le cursus scolaire, mais ils ne sont pas mis au profit des élèves car seuls 41,5% ont été sensibilisés à l'école et surtout en 3ème.

Le désir de cesser y est, mais doit être renforcé par des séances d'aide au sevrage tabagique et par des consultations antitabac au niveau des structures sanitaires.

L'exposition d'autres personnes au tabagisme passif est très fréquente pour les jeunes scolarisés aussi bien à la maison que dans les lieux publics. C'est ainsi que la loi contre le tabagisme doit être promulguée et vulgarisée.

Notre étude a révélé que le rôle important joué par les médias dans la sensibilisation de la population en général et de la jeunesse en particulier sur les méfaits du tabac puisque, plus de la moitié des élèves ont été informés sur les dangers du tabagisme à travers ces canaux de communication.

Cependant, malgré l'existence des dispositions conventionnelles sur la lutte antitabac ratifiées par le Gouvernement de la République, nous avons noté dans cette étude que les fabricants du tabac trouvent toujours des moyens pour faire passer des messages pro- tabac dans des journaux et des magazines. Ils distribuent des objets avec logo de marque de cigarette et même les cigarettes dans les écoles primaires, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain.

Le tabac est disponible dans tout le pays et l'accessibilité est sans contrainte le confirme les résultats de l'enquête (Plus de la moitié d'entre eux se procurent régulièrement des cigarettes sans aucune opposition par rapport à leur âge)

Aussi, pour une lutte efficace contre les méfaits du tabagisme en milieu jeune, faisons- nous les recommandations suivantes au Ministère de la Santé et aux alliés stratégiques.

Recommandations :

- Elaborer une politique nationale de lutte contre le tabac;
- Intensifier les campagnes d'IEC sur les effets nocifs du tabac sur la santé à tous les niveaux, administratif, communautaire, etc...;
- Concevoir et mettre en œuvre des programmes de sevrage pour les jeunes;
- Réaliser des enquêtes complémentaires sur le profil des usagers du tabac en milieu scolaire afin de fournir les données scientifiques à même d'orienter les interventions en la matière;

- Renforcer le rôle des médias dans la sensibilisation sur la lutte antitabac.
 - Créer un programme de lutte antitabac à l'école;
 - Promulguer et vulgariser la loi contre le tabagisme ;
- Prendre des textes d'application de la loi contre le tabagisme.